

---

2022 학교예술강사 지원사업  
「코로나바이러스감염증19」 대응 지침

---

2022. 3.

한국문화예술교육진흥원

## I 목적 및 기본방향

### 1. 목 적

- 학교예술강사 지원사업 추진 관련 코로나바이러스감염증-19의 확산 및 감염 예방을 통한 사업 운영 안정성 제고

### 2. 기본방향

- 학교예술강사 지원사업은 각 급 학교를 대상으로 실시하는 정책 사업으로서, 사업 추진 시 참여자들의 고강도 예방 및 관리대응 필요
  - (방역지침) 사회적 거리두기 방역 수칙 준수하여 생활방역 실천
  - (예방관리) 출강전 자가문진 시행을 통한 감염 관리 등

## II 예술강사 감염예방 및 출강관리

### 1. 예술강사 감염예방 관리

#### 1) 예술강사 감염예방, 환경위생 관리

- 개인위생 준수(마스크 착용, 손씻기, 교실 환기시키기 등)를 철저히 하여 학생 교육 진행
- 학교 교실 환경위생 관리
  - 교실 등 창문은 원칙적으로 개방하여 교육. 다만, 기상상황(온도, 강수, 미세먼지 등) 등의 여건을 고려하여 상시개방이 어려운 경우 창문을 수시(쉬는시간 마다) 개방하거나 환기설비를 가동하여 충분히 환기 실시
- 코로나-19 의심증상이 있는 경우, 학교로 출강하지 않고 학교 담당교사와 지역운영기관 담당자에게 즉각 고지 후 선별진료소, 진단검사가 가능한 지정 의료기관에 방문하여 진료·검사를 받거나 신속항원검사 키트 이용하여 자체 검사 진행 필요

※ 질병관리청 홈페이지 참조(방역당국의 '새로운 생활 속 방역수칙'을 활용하여 학교에 적용)

새로운 학교 방역수칙	
1	미접종자는 기본접종하기, 2차 접종 유효기간 만료 전 3차 접종하기(대상자에 한함)
2	올바른 마스크 착용으로 입과 코 가리기, 특히 감염위험시설(3밀(밀폐·밀접·밀집) 환경, 감염취약시설(요양시설)에서는 반드시 보건용 마스크(KF80 이상) 착용하기
3	30초 비누로 손 씻기, 기침은 옷소매로 가리고 하기
4	상시 환기를 원칙으로 하되, 기상상황 등으로 상시 환기가 어려운 경우 쉬는 시간마다 환기(맞통풍)하고, 손이 많이 닿는 곳(문고리, 스위치 등)은 1일 1회 이상 소독하기
5	사적 모임의 규모와 시간은 최소화하기
6	아프면 검사 받고, 집에 머물며 고위험군(60세 이상, 기저질환자 등) 만남 자제하기

## 2. 예술강사 출강관리

### 1) 예술강사 출강일 자가문진 실시

- (자가문진 실시) 모든 예술강사는 학교 출강 전 건강상태를 확인하여 코로나-19 자가문진 결과를 시행하고 운영기관에 제출 필요 (매 출강일별 1회)

※ 제출 방법 등 향후 운영기관에서 안내 예정

### 2) 예술강사 주요 상황별 출강 기준

- (긴급 출강 중단조치 운영) 다음의 경우 예술강사는 출강을 즉시 중단하고 학교 담당교사와 지역운영기관 담당자에게 즉각 고지 진행. 필요 시 강사는 출강하는 학교별 「학교자체 방역관리 계획」을 고려하여 교육활동 대응 필요

#### <출강 중단 사항>

- 코로나19 확진(양성) 통보 문자를 받은 경우
- 자가문진 결과 발열, 기침 등 코로나19 주요증상 확인한 경우
- 코로나19 의심증상으로 검사결과를 기다리는 경우
- 동거인이 확진자인 경우
- 기타 코로나19 감염 의심 정황이 있는 경우

○ (코로나19 상황별 격리기간 및 등교(출근)기준)

※ 중앙대책본부 지침 변경에 따라 하단 내용(격리기간 및 출강기준) 변경될 수 있음

구분	나의 상황		
	격리·감시기간	검사	등교(출근) 기준
“내가” 확진자인 경우 ①	격리*(7일)	-	격리기간 중 등교중지
“동거인이” 확진자인 경우 ②	수동감시(10일)	3일 이내 ‘PCR 검사*’ 권고 * PCR 검사를 우선 권고하며, 전문가용 신속항원검사라도 대체가능	검사결과 확인 시까지 등교(출강)중지 권고
		6~7일차 신속항원검사 권고	등교(출강)

\* 격리·감시해제일, 검사기준일 산정: 확진자의 검사일(검체채취일)로부터 계산

※ (참고) 지정의료기관에서 유증상자가 전문가용 신속항원검사에서 양성 결과가 나온 경우 의사 판단하에 확진으로 간주(3.14부터 한달간 한시 적용, 중대본)

[상세설명]

① 본인이 확진되어 방역당국으로부터 격리 통보 받은 경우

- 접촉 여부와 관계없이 7일간 출강 중지하고 격리
- ☞ 확진자는 격리 해제 전 검사(PCR, 신속항원검사) 대상 아님

② 나의 동거인이 확진자인 경우

- ‘나’는 10일간 수동감시이며, 내가 받는 검사는 확진자(동거인) 검사일(검체채취일) 기준으로 “3일 이내 PCR 검사\*, 6~7일차 신속항원검사”를 권고하고, PCR 검사결과 확인 시까지는 등교·출근중지(자택대기)를 권고

\* 3일 이내 PCR 검사를 우선 권고하며, 전문가용 신속항원검사(지정의료기관)로도 대체가능

※ 10일 동안 매일 아침·저녁 자신의 건강상태를 확인하고, 발열, 기침 등 증상이 관찰되면 가까운 의료기관 방문

◆ (참고) 전문가용 신속항원검사 운영 개선 방안(3.14부터 한 달간 한시 적용, 방대본)

지정의료기관에서 유증상자가 전문가용 신속항원검사서 양성 결과가 나온 경우 의사 판단하에 확진으로 간주\*하여 PCR 검사 양성 확진과 동일하게 관리

\* 응급환자에 대한 신속 조치를 위해 긴급 사용 승인된 응급용 선별검사(PCR) 양성인 경우에도 확진으로 간주

※ 참고 : 「코로나바이러스감염증-19 대응지침」(지자체용) 등

3) 코로나19 관련 결손시수 처리

- (수업조정) 코로나19로 인해 출강하지 못한 시수는 학생들의 학습권 보장을 위해 운영학교와 협의하여 출강일정을 조정하거나 원격 수업으로 변경하여 최대한 시수를 소화하는 것을 원칙으로 진행

- 수업조정 노력에도 코로나19로 인한 학교의 일시 휴교 조치, 강사의 코로나19 확진 또는 보건당국의 자가격리 조치로 휴업 시수 발생 시, 휴업발생 신고서' 및 필요 증빙자료 보관 필요

※ 휴업발생 신고서, 관련자료(양식) 등 결손시수 처리 방안 추후 별도 안내 예정

#### 4) 예술강사 백신접종 관련

- 예방 접종 당일에 수업이 있는 경우, 운영학교와 수업일정 조정하되 월 시수 내에서 일정 협의 및 진행 필요

※ (백신 미접종자 및 3차 접종대상자 백신 접종 권장) 면역회피로 돌파감염 위험 증가, 중증·사망예방 효과는 소폭 감소

- 참고 1) 코로나19 확진자 및 동거인 안내문(22.3.6.)
- 참고 2) 코로나19 확진자 및 동거인 재택치료 안내문(22.3.6.)
- 참고 3) 오미크론 대응 국민행동수칙(22.3.10.)
- 참고 4) 코로나바이러스감염증-19 예방 행동수칙(20.11.11.)
- 참고 5) 학교 내 마스크 착용 수칙



**확진자**

**! 치료안내**

오미크론변이는 델타변이보다 중증도가 낮아 무증상, 경증 확진자는 해열제, 감기약 복용 등 대증치료를 통해 회복이 가능합니다.

- ✓ 휴식과 안정을 취하면서, 수분을 충분히 섭취하세요.
- ✓ 증상이 있을 때는 진통해열제, 종합감기약 등을 복용하세요.
  - 경증(인후통 등)인 경우 해열제, 감기약 등 대증치료를 통해 대체로 호전
  - \* 단, 중증으로 진행할 수 있는 고위험군은 항바이러스제(먹는치료제) 투약 가능
- ✓ 발열 등 증상으로 진료가 필요하면, 전화 상담·처방이 가능합니다.
  - \* 코로나19 관련 진료에 대해서 본인부담금은 발생하지 않음



**! 격리안내**

검체채취 후 결과 확인시까지 가급적 외출을 자제\*합니다. 확진자에 대한 법정격리기간은 통지일(양성 확인일)부터 격리해제일까지이며 집(생활치료센터, 코로나19 감염병 전담병원)에서 격리하게 됩니다.

**격리해제 시점은 검사일(검체채취일)로부터 7일차 자정(24:00)입니다.**  
 \* 불가피한 외출을 할 경우 ①KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용, ②타인과의 대면 최소화, ③사적 모임 및 고위험시설 방문을 자제

- ✓ 감염전파 방지를 위해 외출하지 말고 집에 머물러 주세요. 화장실·물건 등은 동거인과 따로 사용하고, 자주 소독하세요.
  - \* 격리의무 위반 시 감염병예방법에 따라 형사고발 및 처벌 가능

✓ 격리해제 전 검사는 하지 않습니다.

★ 격리해제 후 3일간 주의 권고 : 출근·등교 포함 외출가능하나, KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적모임 자제

✓ 본 안내문은 재택치료자와 동거인이 공유하여 권고사항 준수에 협조 바랍니다.



최신정보를 바로 확인하세요.

# 확진자 및 동거인 안내문

## 공동안내문 ②



### 동거인

**권고준수기간**  
 예방접종완료 여부에 관계없이 **재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일**  
 - 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 신속항원검사 권고  
 \*60세이상 동거인은 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 PCR 검사 권고

### 권고수칙

동거인은 확진자의 확진 전·후 전염력 높은 시기에 공동생활을 통해 바이러스에 노출되어 감염 가능성이 높으므로 검사 및 모니터링이 필요합니다.

- ✓ 동거인은 재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 3일 이내 PCR\* 검사를 받고, 음성으로 확인될 때까지 자택에서 대기해 주세요.
  - \* 확진자의 양성통보 문자를 전달받아 보건소 방문시 제시하면 PCR 검사를 받을 수 있음
  - 6~7일차에 신속항원검사\*를 받으시고 양성으로 확인된 경우 PCR 검사를 받으세요.
  - \* 가장 신속하고 접근이 쉬운 방법으로 검사(자가검사 또는 의료기관, 선별진료소 방문)
  - 60세 이상자의 경우에는 PCR 검사 권고
- ✓ 재택치료자의 검사일부터 10일 동안 다음 사항을 준수해 주세요.
  - 가급적 외출 최소화, 출근 또는 불가피한 외출시는 KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용, 타인과의 대면접촉 최소화, 사적 모임 및 고위험시설 방문 자제, 의심증상 발생시 의료기관 방문

### 건강관리

10일 동안 매일 아침·저녁 코로나19 의심증상이 있는지 자신의 건강상태를 확인하고, 증상 발생 시에는 의료기관을 방문하세요.

- ✓ 코로나19 의심증상은 발열(37.5°C), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 등입니다.
- ✓ 반드시 KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용 등 개인방역수칙을 철저히 준수하여 주세요.

? 의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간·해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영 중인 **'재택치료 행정안내센터'**에 문의하세요.

✓ **지진 등 재난이 발생하면 이렇게 하세요!**

- 지진 등 재난 발생 시 재난 대비 국민행동요령(예: 튼튼한 탁자 아래 몸을 보호)에 따릅니다.
- 재택치료 중에 지진 등 재난 발생으로 집안에서 머무르기 곤란한 경우 외부로 대피할 수 있습니다.
- 외부로 대피 시 반드시 마스크를 착용하고, 타인과의 접촉을 최소화하여야 합니다.





**건강 모니터링**

- ✓ 재택치료자는 재택치료 안내를 위해 발송된 문자(URL) 또는 QR 코드를 이용하여 진료지원 앱을 설치해 주세요.
- ✓ 매일 건강 정보(체온, 혈압, 맥박, 산소포화도, 혈당 등)를 측정하여 진료지원 앱에 입력해 주세요.
- ✓ 재택치료키트<sup>1),2)</sup>를 받은 경우, 체온, 산소포화도 측정 시 활용할 수 있습니다.



1) 체온계, 산소포화도 측정기, 해열제, 세척용 소독제, 자가검사키트(자가검사키트는 동거인용)  
 2) (소아용) 체온계, 해열제, 감기약, 자가검사키트(자가검사키트는 동거인용)-보호자 요청 시 지자체에서 지급

**치료 안내**

- ✓ 증상 발생 시에는 ① 재택치료 키트 내 약물을 복용해 주세요.  
 ② 필요 시 재택치료 집중관리의료기관의 전화상담·처방을 받을 수 있습니다.  
 ③ 대면진료가 필요한 경우에는 외래진료센터\*를 방문하세요.  
 \* 사전예약 후, 도보, 개인차량(본인운전 가능), 방역택시 활용, KF94 마스크 착용
- ✓ 먹는 치료제(팍스로비드)는 의사의 판단 하에 처방이 가능합니다.  
 \* 병용금지약물 복용자, 신장애환자, 중증간장애환자는 투여금지 또는 감량투여가 있으므로 주의 필요
- ✓ 응급상황이 발생하면, 즉시 진료지원 앱 응급전화 또는 재택치료추진단\*에 연락하시기 바랍니다.  
 \* 보건소에서 발송된 문자에 안내된 번호 참조

① 재택치료 배정 알림 예시 (○○구 재택치료추진단) **24시 응급콜**

① ○○병원 000-000-0000    ② ○○구 재택치료추진단 000-000-0000    ③ 위급상황으로 119 전화시 재택치료 받고있는 ○○○임을 밝혀주세요.

① 응급상황 관련 증상

- ☑ 계속 가슴이 아프거나 답답한 경우    ☑ 사람을 못 알아보며 헛소리하는 경우
- ☑ 깨워도 계속 자려고 하는 경우        ☑ 손톱이나 입술이 창백하거나 푸르게 변하는 경우

- ✓ 생활치료센터·재택치료 진료지원시스템을 통해 정신건강 자가진단을 총 2회(재택치료 시작일, 시작일+5일) 실시하고, 필요 시 재택치료팀에 심리상담 연계를 요청하거나, 직접 지역 정신건강복지센터(1577-0199, 24시 운영)로 전화하셔서 심리상담을 받을 수 있습니다.

? 의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간·해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영 중인 '재택치료 행정안내센터'에 문의하세요.

# 재택치료 안내문

일반관리군

\* 지침 변경에 따라 향후 조정될 수 있음



## 건강관리

- ✓ 휴식과 안정을 취하면서 스스로 건강상태를 관찰하세요.
- ✓ 필요 시 동네 병·의원과 호흡기진료 클리닉 등을 통해 전화 상담·처방을 받을 수 있습니다.

## 상담 및 치료 안내

- ✓ 치료가 필요하면, 동네 병·의원, 호흡기전담 클리닉, 호흡기 진료 지정의료기관 등에서 전화 상담·처방\*을 받을 수 있습니다.
  - \* 1일 1회 전화상담 및 처방이 가능하며 (만 11세 이하 소아확진자(예방접종미대상군)는 1일 2회 가능), 추가 본인 부담은 없음
  - \*\* 건강보험심사평가원 누리집(www.hira.or.kr)에서 가까운 의료기관 확인 가능
  - 대면 진료가 필요하면, 사전예약을 하고 외래진료센터\*를 방문할 수 있습니다.
    - \* 도보나 개인차량(본인운전 가능), 방역택시를 활용하여 진료센터로 이동이 가능하며, 이 때는 반드시 KF94 마스크를 착용해야 함
- ✓ 전화 상담을 통해 처방을 받은 경우, 조제된 약은 가족 등 동거인이 수령하시기 바랍니다.
  - 동거인의 수령이 어려운 경우, 약국으로부터 배송 받습니다.
  - \* 건강보험심사평가원 누리집(www.hira.or.kr)에서 재택치료를 위한 처방의약품 조제·전달이 가능한 약국 명단 확인 가능
- ✓ 야간 상담·처방이 필요하면, 24시간 운영하는 재택치료 의료상담센터\*에 전화하여 상담과 처방이 가능합니다.
  - \* 상담센터 연락처는 관할보건소에서 발송된 안내 문자를 참조해주시기 바랍니다.
- ✓ 응급상황이 발생하면, 119 등에 연락하세요.

### ① 응급상황 관련 증상

- ☑ 계속 가슴이 아프거나 답답한 경우
- ☑ 사람을 못 알아보며 헛소리하는 경우
- ☑ 깨워도 계속 자려고 하는 경우
- ☑ 손톱이나 입술이 창백하거나 푸르게 변하는 경우

- ✓ 불안이나 우울 등 심리적 어려움이 있는 경우에는 지역 정신건강 복지센터(1577-0199, 24시간 운영)를 통해 심리상담을 받아보실 수 있습니다.

? 의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간·해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영 중인 '재택치료 행정안내센터'에 문의하세요.



# 재택치료자의 동거인 안내문

\* 지침 변경에 따라 양자 조정될 수 있음



※ 안전장구를 미리 확인해주세요.

- ☑ 권고준수기간 : 예방접종완료 여부에 관계없이 재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일
  - 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 신속항원검사 권고
  - \*60세이상 동거인은 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 PCR 검사 권고

## 10일간의 권고수칙

- ✓ 3일 이내 PCR 검사를 받고, 음성 확인시까지 자택 대기를 권고합니다.
- ✓ 이후에도 가급적 외출을 삼가하여 주시고, 출근 또는 불가피한 외출을 할 경우
  - ①KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용, ②타인과의 대면접촉 최소화, ③사적 모임 및 고위험시설 방문을 자제합니다.
- ✓ 6~7일차에, 가장 신속하고 접근이 쉬운 방법으로 신속항원검사를 받으세요. (자가검사 또는 의료기관, 선별진료소 방문)

## 가족 간 전파 예방

- ✓ 동거인은 확진자와 철저히 공간을 분리하여 생활합니다.
  - 확진자와 마주칠 경우, KF94(또는 동급)마스크와 장갑을 착용합니다.
  - 확진자와 같은 공간에서 식사 및 활동을 절대 하지 않도록 합니다.
  - 환기\*와 표면소독(소독티슈 등을 이용)을 자주 실시합니다.
    - \* 하루 최소 3회 이상, 10분 이상 환기, 환기설비가 있을 경우 상시 가동

## 건강 관리

- ✓ 재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일 동안 매일 아침·저녁 자신의 건강상태를 확인하고, 발열, 기침 등 증상이 관찰되면 가까운 의료기관을 방문합니다.
  - 코로나19 의심증상\*은 발열(37.5°C), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 등입니다.
- ✓ 발열 등 증상으로 진료 및 처방이 필요한 경우, 평소 이용하시는 병·의원을 방문하여 필요한 진료를 받으도록 합니다.
  - \* 진료 및 약 처방 시 본인부담금 발생함
- ✓ 동거인 중 추가 확진자가 발생할 경우, 추가 확진자는 새롭게 7일 격리합니다. 첫 재택치료자 및 다른 동거인의 추가격리는 하지 않습니다.

## ☑ 지진 등 재난이 발생하면 이렇게 하세요!

- 지진 등 재난 발생 시 재난 대비 국민행동요령(예: 튼튼한 탁자 아래 몸을 보호)에 따릅니다.
- 재택치료(자가격리) 중에 지진 등 재난 발생으로 집안에서 머무르기 곤란한 경우 외부로 대피할 수 있습니다.
- 외부로 대피 시 반드시 마스크를 착용하고, 타인과의 접촉을 최소화하여야 합니다.

? 의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간 해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영 중인 '재택치료 행정안내센터'에 문의하세요.

2022.3.6.



# 오미크론 대응 국민행동수칙



## 감염 예방


- ① **예방접종 3차접종(부스터) 적극 참여하기**
  - 3차접종(부스터) 받기, 미접종자는 신속히 1차·2차 접종받기
- ② **3밀(밀폐·밀집·밀접) 환경에서 보건용 마스크(KF80, KF94) 쓰기**
  - 밀폐·밀집·밀접 환경, 감염취약시설 방문 시 KF80, KF94 마스크 권장
  - 예방접종을 받았어도 마스크 착용하기
  - 하루 3번, 10분 이상 문과 창문을 열어 환기하기
- ③ **대면 접촉 줄이기**
  - 사적모임은 6인 이내, • 다중이용시설 이용시간은 짧게, • 대화할 때는 마스크 착용

## 고위험군 조기진단·조기치료


- ④ **(60세 이상, 고위험군) 의심증상시 신속하게 PCR 검사받고, 치료받기**
  - 선별진료소 PCR 검사, 확진 시 먹는 치료제 등 조기 치료받기
- ⑤ **(일반) 의심증상시 신속항원검사 받고, 치료받기**
  - 선별진료소·지정의료기관·자가 신속항원검사(양성 시 PCR검사), 확진 시 재택치료



코로나19로부터 우리를 지키는  
**소중하고 확실한  
행동수칙**



거리를  
**확 띄워요!**



어디서나  
**확 써줘요!**



비누로  
**확 씻어요!**



옷소매로  
**확 막아요!**



밀폐·밀집·밀접  
**확 피해요!**



감염병 궁금할 땐  
**전화해요!**

□ 기본수칙

- ◇ 학교 일과시간 중에는 마스크를 쓰세요.
  - 교실, 복도 등 실내공간에서 다른 사람과 함께 있을 때 마스크를 쓰세요
  - 마스크는 가급적 식품의약품안전처에서 허가한 보건용 마스크(KF 80 이상)를 쓰세요
    - ※ 부득이한 사유(호흡기 질환 등)로 보건용 마스크를 착용하지 못하는 경우 비말 차단용, 수술용 마스크도 착용 가능해요
  - 기저질환이 있는 사람은 의사 선생님과 마스크를 쓰는 것에 대해 상담하고 상담내용에 맞게 써주세요
- ◇ 마스크를 쓰고 있을 때 지켜주세요.
  - 얼굴 크기에 맞는 적당한 마스크를 골라서 코와 입이 보이지 않도록 얼굴에 잘 맞게 쓰세요
  - 마스크를 쓰고 있을 때는 마스크를 만지지 않아요. 만졌다면 30초 이상 흐르는 물과 비누로 손을 씻거나, 손 소독제로 손을 씻듯이 문지르세요
  - 마스크를 서로 바꿔쓰거나, 쓰던 마스크를 다른 사람에게 빌려주면 안돼요
- ◇ 마스크를 쓰기 전이나 벗을 때 지켜주세요.
  - 마스크가 더러워지지 않도록 마스크를 만지기 전에 30초 이상 흐르는 물과 비누로 손을 씻거나, 손 소독제로 손을 씻듯이 문지르세요
  - 마스크를 벗을 때는 앞면에 손을 대지 않고, 끈만 잡고 벗으세요
  - 마스크를 버릴 때는 아무 곳이나 두지 말고 즉시 쓰레기통에 버리고, 30초 이상 흐르는 물과 비누로 손을 씻거나, 손 소독제로 손을 씻듯이 문지르세요
- ◇ 마스크를 잃어버리거나, 더러워질 때, 망가질 때 지켜주세요.
  - 학교에 올 때 마스크를 여유있게 가지고 오고, 마스크를 잃어버리거나, 더러워지거나 망가졌을 때 새 마스크를 쓰세요
  - 새 마스크를 쓰기 전까지는 주변 사람들과 가능한 이야기를 하지 마세요

□ [학생용] 마스크 착용 세부수칙

- ◇ 실내에서 지켜주세요
  - (수업시간)
    - 수업시간에는 마스크를 쓰도록 하고, 토론·영어수업 등과 같이 말을 해야 하는 경우에도 마스크를 쓰고 있어요
    - 머리가 아프거나 숨이 차면, 바로 마스크를 벗고 선생님께 알려세요.
  - (쉬는시간)
    - 쉬는 시간에도 마스크를 계속 쓰고 있어요
    - 화장실을 이용할 때도 마스크를 쓰고, 화장실 이용 후에는 30초 이상 흐르는 물과 비누로 손을 씻으세요
    - 머리가 아프거나 숨이 차면, 바로 마스크를 벗고 선생님께 알려세요.
  - (점심시간)
    - 점심을 위해 줄을 서서 기다리거나, 식사를 마치고 식판을 가져다 놓을 때도 마스크를 써주세요
    - 점심을 먹을 때는 친구와 충분한 거리를 두고 앉아 마스크를 벗어요. 밥을 먹을 때 이야기를 나누지 않아요
    - 벗은 마스크는 얼굴에 닿지 않는 바깥쪽이 식탁에 닿도록 잘 놓아주세요
    - 목걸이를 사용하는 경우 목에 걸어두는 것도 가능해요

## □ [교사용] 마스크 착용 세부수칙

- 수업 중에는 반드시 마스크를 쓰세요.
  - ※ 얼굴 전체를 가리는 보호구를 사용할 경우 학생과 최소 2m 이상 거리를 유지하여야 합니다. 이 경우 학생과 보호자가 보호구 사용에 대해 불안해 하는 경우 사용을 지양합니다.
  - ※ 얼굴 전체를 가리는 보호구(안면보호구)는 이마 부분이 막혀있어야 하며, 귀 옆 부분까지 얼굴 전체를 덮고, 턱 아래 목까지 내려오는 길이어야 합니다.
- 머리가 아프거나 숨이 차면, 바로 마스크를 벗고 수업을 잠시 중단하세요. 이 경우 학생과 2m 이상 거리를 유지하고, 이야기를 가능한 하지 마세요.

## □ [교사용] 학생 지도수칙

- 올바른 마스크 착용방법에 대해 수시로 교육해 주세요
- 학생들이 손쉽게 손 소독제를 이용할 수 있도록 교실, 복도 등에 손 소독제를 비치하고 주기적으로 사용하도록 안내해 주세요
- 학생들이 마스크를 잃어버리거나, 망가졌을 때, 지저분해졌을 때 집에서 가져온 새 마스크를 쓰도록 안내하고, 마스크를 착용하지 않은 상태에서 친구들과 이야기하지 않도록 교육해 주세요
- 기저질환이 있는 학생은 마스크 착용에 대해서 의사와 상담하도록 안내하고, 상담내용에 맞게 해당 학생을 지도해주세요
  - ※ 기저질환 : 만성폐질환, 당뇨, 만성 신질환, 만성 간질환, 만성심혈관질환, 혈액암, 항암치료 암환자, 면역억제제 복용 중인 환자 등